



# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **11 AOUT 2000**

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS Cédex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04  
Télécopie : 01 42 93 59 30

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

# BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI



N° 55-1328

## RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

Cet imprimé est à remplir en lettres capitales

08 540e W/170299

Réservé à l'INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES **13 OCT 1999**  
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL **9912773**  
DÉPARTEMENT DE DÉPÔT **75 INPI PARIS**  
DATE DE DÉPÔT **13 OCT. 1999**

### 1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

L'OREAL - D.P.I.  
Emmanuelle RENARD  
6, rue Bertrand Sincholle  
92585 CLICHY CEDEX

n° du pouvoir permanent | références du correspondant | téléphone  
OA99291/ER | 01.47.56.76.06

### 2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention ☐ demande divisionnaire  
☐ certificat d'utilité ☐ transformation d'une demande de brevet européen

demande initiale  
brevet d'invention

### Établissement du rapport de recherche

☐ différé ☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance ☐ oui ☐ non

### Titre de l'invention (200 caractères maximum)

Utilisation de la DHEA ou de ses précurseurs ou dérivés métaboliques comme dépigmentant.

### 3 DEMANDEUR (S) n° SIREN code APE-NAF

Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination  
L'OREAL

SA  
Forme juridique

Nationalité (s) FRANCAISE

Adresse (s) complète (s)  
14, rue Royale  
75008 PARIS

Pays  
FRANCE

### 4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs

☐ oui ☒ non En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre

### 5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES

☐ requise pour la 1ère fois ☐ requise antérieurement au dépôt ; joindre copie de la décision d'admission

### 6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE

pays d'origine | numéro | date de dépôt | nature de la demande

### 7 DIVISIONS

antérieures à la présente demande n° | date | n° | date

### 8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire)

Emmanuelle RENARD - D.P.I.

### SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION

### SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

DÉPARTEMENT DES BREVETS


26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.  
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif)		OA99291 / ER	
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		99 12773	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum)			
Utilisation de la DHEA ou de ses précurseurs ou dérivés métaboliques comme dépigmentant.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>			
L'OREAL 14, rue Royale 75008 PARIS			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
<b>Nom</b>		DE LACHARRIERE	
<b>Prénoms</b>		Olivier	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	6, rue Edmond Roger	
	<b>Code postal et ville</b>	75015	PARIS
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>Nom</b>		NOUVEAU	
<b>Prénoms</b>		Stéphanie	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	9, rue Salomon Leinach	
	<b>Code postal et ville</b>	92100	BOULOGNE
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>Nom</b>			
<b>Prénoms</b>			
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>		
	<b>Code postal et ville</b>		
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)			
Clichy, 17 février 2000			
Emmanuelle RENARD			

# DOCUMENT COMPORTANT DES MODIFICATIONS

PAGE(S) DE LA DESCRIPTION OU DES REVENDECATIONS OU PLANCHE(S) DE DESSIN			R.M.*	DATE DE LA CORRESPONDANCE	TAMPON DATEUR DU CORRECTEUR
Modifiée(s)	Supprimée(s)	Ajoutée(s)			
4					AMH 14 DEC. 1999
12, 14			X	3 Dec 99	

Un changement apporté à la rédaction des revendications d'origine, sauf si celui-ci découle des dispositions de l'article R.612-36 du code de la Propriété Intellectuelle, est signalé par la mention «R.M.» (revendications modifiées).

La présente invention concerne l'utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques dans ou pour la fabrication d'une composition pour application topique sur la peau, comme agent dépigmentant et/ou blanchissant de la peau, en particulier dans le traitement des taches pigmentaires.

5

La couleur de la peau humaine est fonction de différents facteurs et notamment des saisons de l'année, de l'origine ethnique et du sexe, et elle est principalement déterminée par la nature et la concentration de mélanine produite par les mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules spécialisées qui synthétisent la mélanine organisée sous

10 forme d'organelles particuliers, les mélanosomes. En outre, à différentes périodes de leur vie, certaines personnes voient apparaître sur la peau et plus spécialement sur les mains et le décolleté, des taches plus foncées et/ou plus colorées, conférant à la peau une hétérogénéité. Ces taches sont dues aussi à une concentration importante de mélanine dans les kératinocytes situés à la surface de la peau.

15

Le mécanisme de formation de la pigmentation de la peau, c'est-à-dire de la formation de la mélanine est particulièrement complexe et fait intervenir schématiquement les principales étapes suivantes :

20 Tyrosine → Dopa → Dopaoquinone → Dopachrome → Mélanine

La tyrosinase (monophénol dihydroxyl phénylalanine : oxygen oxydo-reductase EC 1.14.18.1) est l'enzyme essentielle intervenant dans cette suite de réactions. Elle catalyse notamment la réaction de transformation de la tyrosine en Dopa

25 (dihydroxyphénylalanine) grâce à son activité hydroxylase et la réaction de transformation de la Dopa en dopaoquinone grâce à son activité oxydase. Cette tyrosinase n'agit que lorsqu'elle est à l'état de maturation sous l'action de certains facteurs biologiques.

30 Une substance est reconnue comme dépigmentante si elle agit directement sur la vitalité des mélanocytes épidermiques où se déroule la mélanogénèse et/ou si elle interfère avec une des étapes de la biosynthèse de la mélanine soit en inhibant une des enzymes impliquées dans la mélanogénèse, soit en s'intercalant comme analogue structural d'un des composés chimiques de la chaîne de synthèse de la mélanine, chaîne qui peut alors

35 être bloquée et ainsi assurer la dépigmentation.

Les substances les plus utilisées en tant que dépigmentants sont plus particulièrement l'hydroquinone et ses dérivés, en particulier ses éthers tels que le monométhyléther et le monoéthyléther d'hydroquinone. Ces composés, bien qu'ils présentent une efficacité certaine, ne sont malheureusement pas exempts d'effets secondaires du fait de leur toxicité, ce qui peut rendre leur emploi délicat, voire dangereux. Cette toxicité provient de ce qu'ils interviennent sur des mécanismes fondamentaux de la mélanogénèse en tuant des cellules qui risquent alors de perturber leur environnement biologique et qui par conséquent obligent la peau à les évacuer en produisant des toxines.

10 Ainsi, l'hydroquinone est un composé particulièrement irritant et cytotoxique pour le mélanocyte, dont le remplacement, total ou partiel, a été envisagé par de nombreux auteurs.

15 L'utilisation de substances dépigmentantes topiques inoffensives présentant une bonne efficacité est tout particulièrement recherchée en vue de traiter les hyperpigmentations régionales par hyperactivité mélanocytaire telles que les mélasmas idiopathiques, survenant lors de la grossesse ("masque de grossesse" ou chloasma) ou d'une contraception oestro-progestative, les hyperpigmentations localisées par hyperactivité et prolifération mélanocytaire bénigne, telles que les taches pigmentaires séniles dites  
20 lentigo actiniques, les hyperpigmentations ou dépigmentations accidentelles, éventuellement dues à la photosensibilisation ou à la cicatrisation post-lésionnelle, ainsi que certaines leucodermies, telles que le vitiligo. Pour ces dernières (les cicatrises pouvant aboutir à une cicatrice donnant à la peau un aspect plus blanc et les leucodermies), à défaut de pouvoir repigmenter la peau lésée, on achève de  
25 dépigmenter les zones de peau normale résiduelle pour donner à l'ensemble de la peau une teinte blanche homogène.

Aussi, il subsiste le besoin d'un nouvel agent blanchissant de la peau humaine à action aussi efficace que ceux connus, mais n'ayant pas leurs inconvénients, c'est-à-dire qui  
30 soit non irritant, non toxique et/ou non allergisant pour la peau.

La demanderesse a trouvé de manière inattendue que la DHEA et l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques présentent une activité dépigmentante, même à faibles concentrations, sans faire preuve de cytotoxicité.

La DHEA, ou déhydroépiandrostérone, est un stéroïde naturel produit essentiellement par les glandes corticosurrénales. Elle est connue pour ses propriétés anti-âge, liées à sa capacité à promouvoir la kératinisation de l'épiderme (JP-07 196 467) et à lutter contre l'ostéoporose (US-5,824,671), ou encore dans le traitement des peaux sèches, en raison de son aptitude à augmenter la production endogène et la sécrétion de sébum et à renforcer l'effet barrière de la peau (US-4,496,556). La DHEA est également décrite dans le traitement de l'obésité et du diabète (WO 97/13500). Il a en outre été proposé d'utiliser le sulfate de DHEA contre l'alopecie (JP-60 142 908) et pour traiter différents signes du vieillissement tels que les rides, la perte d'éclat de la peau et le relâchement cutané (EP-0 723 775). Toutefois, il n'a encore jamais été suggéré que la DHEA ou l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques pouvaient avoir une activité dépigmentante en agissant directement sur la mélanogénèse.

La présente invention a donc pour objet l'utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques dans une composition cosmétique pour application topique sur la peau, comme agent dépigmentant et/ou blanchissant de la peau.

L'invention a aussi pour objet l'utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques pour la fabrication d'une composition pour application topique sur la peau, destinée à la dépigmentation et/ou au blanchiment de la peau.

En particulier, l'invention a pour objet l'utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques pour la fabrication d'une composition pour application topique sur la peau, destinée au traitement des taches pigmentaires, telles que les lentigo actiniques.

Il a également été découvert que la DHEA permettait d'améliorer l'homogénéité de la couleur de la peau.

La présente invention a donc aussi pour objet l'utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques dans une composition cosmétique pour application topique sur la peau, pour améliorer l'homogénéité de la peau.



La DHEA utilisable selon l'invention est par exemple disponible auprès de la société SIGMA ou d'AKZO NOBEL.

5 Par précurseurs de la DHEA, on entend ses précurseurs biologiques immédiats ou substrats, et non ses précurseurs chimiques. Des exemples de précurseurs sont le cholestérol, la prégnénolone, la  $17\alpha$ -hydroxy prégnénolone, le 5-androstènediol, le sulfate de DHEA, le sulfate de  $17\alpha$ -hydroxy prégnénolone et le sulfate de 5-androstènediol, sans que cette liste soit limitative.

10 Par "dérivés métaboliques" de la DHEA, on entend notamment le 5-androstène- $3\beta$ - $17\beta$ -diol (ou adiol), le sulfate de 5-androstène- $3\beta$ - $17\beta$ -diol et la 4-androstène-3,17-dione, sans que cette liste soit limitative.

15 La composition contenant la DHEA ou l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques est appropriée à une utilisation topique et elle contient donc un milieu physiologiquement acceptable, c'est-à-dire compatible avec la peau et ses phanères tels que les poils ou les cheveux.

20 Cette composition peut renfermer de  $10^{-6}$  à 10% en poids, avantageusement de 0,1 à 5% en poids, et mieux, environ 1% en poids de DHEA ou de son précurseur ou dérivé métabolique.

25 Elle peut se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique, notamment sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux, ou d'un produit anhydre liquide, pâteux ou solide.

30 Cette composition peut être plus ou moins fluide et avoir l'aspect d'une crème blanche ou colorée, d'une pommade, d'un lait, d'une lotion, d'un sérum, d'une pâte, d'une mousse. Elle peut éventuellement être appliquée sur la peau sous forme d'aérosol. Elle peut également se présenter sous forme solide, et par exemple sous forme de stick. Elle peut être utilisée comme produit de soin et/ou comme produit de maquillage.

35 De façon connue, la composition selon l'invention peut contenir également les adjuvants habituels dans les domaines cosmétique et dermatologique, tels que des gélifiants

hydrophiles ou lipophiles, des actifs hydrophiles ou lipophiles, des conservateurs, des antioxydants, des solvants, des parfums, des charges, des filtres, des pigments, des absorbeurs d'odeur et des matières colorantes. Les quantités de ces différents adjuvants sont celles classiquement utilisées dans les domaines considérés, et par exemple de 0,01 à 20 % du poids total de la composition. Ces adjuvants, selon leur nature, peuvent être introduits dans la phase grasse, dans la phase aqueuse, dans des vésicules lipidiques et/ou dans des nanoparticules.

Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir ces éventuels composés complémentaires, actifs ou non actifs, et/ou leur quantité, de telle manière que les propriétés avantageuses de la DHEA ou de ses précurseurs ou dérivés ne soient pas, ou sensiblement pas, altérées par l'adjonction envisagée.

Lorsque la composition selon l'invention est une émulsion, la proportion de la phase grasse peut aller de 0,5 à 80 % en poids, et de préférence de 5 à 50 % en poids par rapport au poids total de la composition. Les huiles, les émulsionnants et les coémulsionnants utilisés dans la composition sous forme d'émulsion sont choisis parmi ceux classiquement utilisés dans le domaine considéré. L'émulsionnant et le coémulsionnant sont présents, dans la composition, en une proportion allant de 0,3 à 30 % en poids, et de préférence de 0,5 à 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Comme huiles utilisables dans l'invention, on peut citer les huiles minérales (huile de vaseline), les huiles d'origine végétale (huile d'avocat, huile de soja), les huiles d'origine animale (lanoline), les huiles de synthèse (perhydrosqualène), les huiles siliconées (cyclométhicone) et les huiles fluorées (perfluoropolyéthers). On peut aussi utiliser comme matières grasses des alcools gras (alcool cétylique), des acides gras, des cires (cire de carnauba, ozokérite).

Comme émulsionnants et coémulsionnants utilisables dans l'invention, on peut citer par exemple les esters d'acide gras et de polyéthylène glycol tels que le stéarate de PEG-20, et les esters d'acide gras et de glycérine tels que le stéarate de glycéryle.

Comme gélifiants hydrophiles, on peut citer en particulier les polymères carboxyvinyles (carbomer), les copolymères acryliques tels que les copolymères

d'acrylates/alkylacrylates, les polyacrylamides, les polysaccharides, les gommes naturelles et les argiles, et, comme gélifiants lipophiles, on peut citer les argiles modifiées comme les bentones, les sels métalliques d'acides gras, la silice hydrophobe et les polyéthylènes.

5

Comme actifs, on peut utiliser notamment les polyols, les vitamines, les agents kératolytiques et/ou desquamants, les agents anti-inflammatoires, les agents apaisants et leurs mélanges. En outre, bien que la DHEA et ses précurseurs ou dérivés métaboliques aient à eux seuls une activité dépigmentante justifiant leur utilisation  
 10 comme seul actif dépigmentant d'une composition blanchissante, on peut également ajouter à la composition selon l'invention d'autres agents dépigmentants, ce qui permet d'utiliser ces derniers à des doses moins élevées. En cas d'incompatibilité, certains au moins des actifs peuvent être incorporés dans des sphérules, notamment des vésicules ioniques ou non-ioniques et/ou des nanoparticules (nanocapsules et/ou nanosphères),  
 15 de manière à ce que les actifs incompatibles entre eux soient isolés les uns des autres dans la composition.

Selon une forme de réalisation préférée de l'invention, les compositions contenant la DHEA ou ses précurseurs ou dérivés renferment en outre au moins un filtre UV et/ou un  
 20 autre agent dépigmentant et/ou un agent kératolytique.

Comme filtres UV, on peut citer :

(1) les dérivés de dibenzoylméthane et en particulier le 4-(ter.-butyl) 4'-méthoxy  
 25 dibenzoylméthane, notamment celui proposé à la vente sous la dénomination commerciale de "PARSOL 1789" par la Société GIVAUDAN, et le 4-isopropyl-dibenzoylméthane, filtre vendu sous la dénomination de "EUSOLEX 8020" par la Société MERCK ;

(2) les filtres actifs dans l'UVA dérivés du benzylidène camphre, dont un exemple  
 30 particulièrement préféré est l'acide benzène 1,4-[di(3-méthylidèncampho 10-sulfonique)] tel que le produit vendu sous le nom MEXORYL SX par la société CHIMEX, décrit notamment dans les demandes de brevets FR-A- 2 528 420 et FR-A- 2 639 347 ;

(3) les filtres actifs dans l'UVB dérivés du benzylidène camphre, et en particulier  
 le 4-méthyl benzylidène camphre, disponible auprès de la société MERCK sous la  
 35 dénomination commerciale EUSOLEX 6300 ;

(4) les filtres actifs dans l'UV-A du type benzimidazole ou benzoxazole, tels que l'acide 2-phényl benzimidazole 5-sulfonique, disponible auprès de la société MERCK sous la dénomination commerciale EUSOLEX 232 ;

5 (5) les dérivés de benzophénone qui peuvent être avantageusement choisis dans le groupe constitué par : la 2-hydroxy-4-méthoxy-benzophénone, encore appelé oxybenzone (benzophénone-3) comme le produit vendu sous le nom UVINUL M40 par BASF ; et l'acide 2-hydroxy-4-méthoxy-benzophénone-5-sulfonique, encore appelé sulisobenzone (benzophénone-4) comme le produit vendu sous le nom UVINUL MS 40 par BASF, ainsi que sa forme sulfonate de sodium (benzophénone-5) ;

10 (6) les dérivés silanes ou les polyorganosiloxanes à groupement benzophénone tels que ceux décrits dans les documents EP-A-0389 377, FR-A-2 657 351 et EP-A-0 655 453 ;


15 (7) les benzotriazoles et silicones benzotriazoles, de préférence ceux décrits dans les brevets US-4316033, US-4328346, EP-B-0354145, EP-B-0392883 et EP-B-0660701 ;

(8) les dérivés de triazines décrits notamment dans le brevet US4617390 et les demandes de brevet EP-A-087098, EP-A-0517104, EP-A-0570838 et EP-A-0796851, en particulier la 2,4,6-tris[p-(2'-éthylhexyl-1'-oxy-carbonyl)anilino]-1,3,5-triazine vendue notamment sous la dénomination commerciale de UVINUL T 150 par la Société BASF ;

20 (9) les dérivés de l'acide cinnamique tels que le para-méthoxy cinnamate de 2-éthylhexyle, vendu notamment sous le nom commercial PARSOL MCX par la Société GIVAUDAN ;

(10) les 2-cyano-3,3-diphénylacrylate d'alkyle et, de manière préférentielle, l'octocrylène vendu sous le nom Uvinul N 539 par la Société BASF ;

25 (11) le composé de formule (I) suivante, ou 2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-méthyl-6-[2-méthyl-3-[1,3,3,3-tétraméthyl-1-[(triméthylsilyl)oxy] disiloxanyl]propynyl]phénol, décrit dans la demande de brevet EP-A-0 392 883 :



(12) et leurs mélanges.

- 5 Comme autre agent dépigmentant, les compositions selon l'invention peuvent par exemple comprendre au moins l'un des composés suivants : l'acide kojique ; l'acide ellagique ; l'arbutine et ses dérivés tels que ceux décrits dans les demandes EP-895 779 et EP-524 109 ; l'hydroquinone ; les dérivés d'aminophénol tels que ceux décrits dans les demandes WO 99/10318 et WO 99/32077, et en particulier le N-cholestéryloxy-carbonyl-para-aminophénol et le N-éthoxyloxy-carbonyl-para-aminophénol ; les dérivés d'iminophénol, en particulier ceux décrits dans la demande WO 99/22707 ; l'acide L-2-oxothiazolidine-4-carboxylique ou procystéine, ainsi que ses sels et esters ; l'acide ascorbique et ses dérivés, notamment le glucoside d'ascorbyle ; et les extraits de plantes, en particulier de réglisse, de mûrier et de scutellaire, sans que cette liste soit
- 10
- 15 limitative.

Les agents kératolytiques susceptibles d'être utilisés dans les compositions selon l'invention comprennent notamment les  $\alpha$ -hydroxyacides tels que les acides citrique, lactique, glycolique, mandélique, malique et tartrique ; les  $\beta$ -hydroxyacides et notamment

20 l'acide salicylique et ses dérivés décrits dans les demandes FR-A-2 581 542, EP-875 495, WO 98/35973 et EP-756 866; les  $\alpha$ -cétoacides et les  $\beta$ -cétoacides ; les rétinoïdes et en particulier le rétinol et les esters de rétinyle ; les inhibiteurs d'HMG-CoA réductas , comme décrit dans la demande EP-738 510 ; et les dérivés de sucre tels que ceux décrits dans la demande EP-853 472, et en particulier le O-octanoyl-6'- $\beta$ -D-maltose.

25

Ces compositions constituent notamment des crèmes de protection, de traitement ou de soin pour le visage, pour les mains ou pour le corps, des laits corporels de protection ou de soin, des lotions, gels ou mousses pour le soin ou le traitement de la peau, des lotions

d nettoyage ou de désinfection, des compositions pour le bain, des fonds de teint et des crèmes teintées. Dans ces derniers cas, la composition contient des pigments.

L'invention va maintenant être illustrée à l'aide des exemples non limitatifs suivants.

5

### **Exemple 1 : Composition à base de DHEA**

On a préparé la composition suivante, dans laquelle les proportions des différents constituants sont indiquées en pourcentage pondéral :

10

DHEA	2	%
Isostéarate de propylène glycol	13	%
Polyéthylène glycol (8 OE)	5	%
Propylène glycol	3	%
15 Pentylène glycol	3	%
Stéarate de glycéryle et stéarate de polyéthylène glycol (100 OE)	5	%
Mono-stéarate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE)	0,5	%
Alcool cétylique oxyéthyléné (20 OE) oxypropyléné (5 OP)	1	%
20 Gélifiants	0,5	%
Benzoates d'alkyle en C <sub>12-15</sub>	4	%
Ethanol	3	%
Hydroxyde de sodium	0,12	%
Conservateurs	0,7	%
25 Eau	qsp.	100 %

### **Exemple 2 : Mise en évidence de l'activité dépigmentante de la DHEA**

#### a- Protocole

30

On a testé une émulsion huile-dans-eau gélifiée, renfermant 1% en poids de DHEA comme seul actif, sur un groupe de vingt sujets de sexe féminin, âgés de 55 à 70 ans. L'émulsion a été appliquée matin et soir pendant quatre mois sur le dos d'une main.

Les taches présentes sur la peau ont été évaluées avant et après traitement par observation visuelle réalisée par un expert, en attribuant aux taches un score global de 0 à 7 en fonction de leur nombre, de leur taille et de leur intensité (évaluation clinique).


- 5 Elles ont également été évaluées par colorimétrie, à l'aide d'un chromamètre Minolta CR200 (évaluation biophysique). Cet appareil décrit les couleurs dans un espace à trois dimensions, en utilisant le système de coordonnées L, a\* et b\* recommandé par la CIE, où L\* exprime la luminance ou clarté de la couleur (0 correspondant au blanc et 100 au noir), a\* est la composante de séparation entre le vert (négatif) et le rouge (positif) et est
- 10 corrélée à l'érythème cutané, et b\* varie du bleu (négatif) au jaune (positif) et exprime la pigmentation cutanée. Ce paramètre b\* a été utilisé pour évaluer l'évolution des taches au cours du traitement. Il est la résultante de la moyenne de six mesures individuelles effectuées par zone et par temps de mesure.

## 15 b- Résultats

Evaluation clinique :

20

25




30

Le graphe ci-dessus montre une amélioration du score clinique global des taches pigmentaires sur la main traitée avec la DHEA alors que ce score est constant sur la main non traitée.

Evaluation biophysique :

5

10



- 15 Le graphe ci-dessus montre une diminution de la composante b de la couleur de la peau, donc une réduction de la pigmentation de la peau, plus importante sur la main traitée à la DHEA que sur la main non traitée.




## REVENDICATIONS

1. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques dans une composition cosmétique pour application topique sur la peau,  
5 comme agent dépigmentant et/ou blanchissant de la peau.
2. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques dans une composition cosmétique pour application topique sur la peau, pour améliorer l'homogénéité de la peau.  
10
3. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques pour la fabrication d'une composition pour application topique sur la peau, destinée à la dépigmentation et/ou au blanchiment de la peau.
- 15 4. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques pour la fabrication d'une composition pour application topique sur la peau, destinée au traitement des taches pigmentaires, en particulier des lentigo actiniques.
- 20 5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit précurseur est choisi parmi : le cholestérol, la prégnénolone, la 17 $\alpha$ -hydroxy prégnénolone, le 5-androstènediol, le sulfate de DHEA, le sulfate de 17 $\alpha$ -hydroxy prégnénolone et le sulfate de 5-androstènediol.
- 25 6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit dérivé métabolique est choisi parmi : le 5-androstène-3 $\beta$ -17 $\beta$ -diol (ou adiol), le sulfate de 5-androstène-3 $\beta$ -17 $\beta$ -diol et la 4-androstène-3,17-dione.
- 30 7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la DHEA ou son précurseur ou dérivé métabolique est présent en une quantité allant de 10<sup>-6</sup> à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition.
8. Utilisation selon la revendication 7, caractérisée en ce que la DHEA ou son précurseur ou dérivé métabolique est présent en une quantité allant de 0,1 à 5% en poids, par rapport au poids total de la composition.

9. Utilisation selon la revendication 8, caractérisée en ce que la DHEA ou son précurseur ou dérivé métabolique est présent en une quantité d'environ 1% en poids, par rapport au poids total de la composition.

5 10. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite composition renferme en outre au moins un filtre UV et/ou un autre agent dépigmentant et/ou un agent kératolytique.

11. Utilisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit filtre UV est choisi  
 10 parmi : les dérivés de dibenzoylméthane et en particulier le 4-(ter.-butyl) 4'-méthoxy dibenzoylméthane et le 4-isopropyl-dibenzoylméthane ; les filtres actifs dans l'UVA dérivés du benzylidène camphre, tels que l'acide benzène 1,4-[di(3-méthylidénecampho 10-sulfonique)] ; les filtres actifs dans l'UVB dérivés du benzylidène camphre, et en particulier le 4-méthyl benzylidène camphre ; les filtres actifs dans l'UV-A du type  
 15 benzimidazole ou benzoxazole, tels que l'acide 2-phényl benzimidazole 5-sulfonique ; les dérivés de benzophénone notamment choisis dans le groupe constitué par : la 2-hydroxy-4-méthoxy-benzophénone, l'acide 2-hydroxy-4-méthoxy-benzophénone-5-sulfonique, et sa forme sulfonate de sodium ; les dérivés silanes ou les polyorganosiloxanes à groupement benzophénone ; les benzotriazoles et silicones  
 20 benzotriazoles ; les dérivés de triazines, en particulier la 2,4,6-tris[p-(2'-éthylhexyl-1'-oxy-carbonyl)anilino]-1,3,5-triazine ; les dérivés de l'acide cinnamique tels que le para-méthoxy cinnamate de 2-éthylhexyle ; les 2-cyano-3,3-diphénylacrylate d'alkyle et, de manière préférentielle, l'octocrylène ; le composé de formule (I) suivante, ou 2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-méthyl-6-[2-méthyl-3-[1,3,3,3-tétraméthyl-1-[(triméthylsilyl)oxy]  
 25 disiloxanyl]propynyl]phénol :



et leurs mélanges.

12. Utilisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit autre agent dépigmentant est choisi parmi : l'acide kojique ; l'acide ellagique ; l'arbutine et ses dérivés ; l'hydroquinone ; les dérivés tels que le N-cholestéryloxy-carbonyl-para-aminophénol et le N-éthoxyloxy-carbonyl-para-aminophénol ; les dérivés d'iminophénol ; l'acide L-2-oxothiazolidine-4-carboxylique ou procystéine, ainsi que ses sels et esters ; l'acide ascorbique et ses dérivés, notamment le glucoside d'ascorbyle ; et les extraits de plantes, en particulier de réglisse, de mûrier et de scutellaire.
- 10
13. Utilisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit agent kératolytique est choisi parmi : les  $\alpha$ -hydroxyacides tels que les acides citrique, lactique, glycolique, mandélique, malique et tartrique ; les  $\beta$ -hydroxyacides et notamment l'acide salicylique et ses dérivés ; les  $\alpha$ -cétoacides et les  $\beta$ -cétoacides ; les rétinoïdes et en particulier le rétinol et les esters de rétinyle ; les inhibiteurs d'HMG-CoA réductase ; et les dérivés de sucre tels que le O-octanoyl-6'- $\beta$ -D-maltose.
- 15

La DHEA utilisable selon l'invention est par exemple disponible auprès de la société SIGMA ou d'AKZO NOBEL.

5 Par précurseurs de la DHEA, on entend ses précurseurs biologiques immédiats ou substrats, et non ses précurseurs chimiques. Des exemples de précurseurs sont le cholestérol, la prégnénolone, la  $17\alpha$ -hydroxy prégnénolone, le 5-androstènediol, le sulfate de DHEA, le sulfate de  $17\alpha$ -hydroxy prégnénolone et le sulfate de 5-androstènediol, sans que cette liste soit limitative.

10 Par "dérivés métaboliques" de la DHEA, on entend notamment le 5-androstène- $3\beta$ - $17\beta$ -diol (ou adiol), le sulfate de 5-androstène- $3\beta$ - $17\beta$ -diol et la 4-androstène-3,17-dione, sans que cette liste soit limitative.

15 La composition contenant la DHEA ou l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques est appropriée à une utilisation topique et elle contient donc un milieu physiologiquement acceptable, c'est-à-dire compatible avec la peau et ses phanères tels que les poils ou les cheveux.

20 Cette composition peut renfermer de  $10^{-6}$  à 10% en poids, avantageusement de 0,1 à 5% en poids, et mieux, environ 1% en poids de DHEA ou de son précurseur ou dérivé métabolique, par rapport au poids total de la composition.

25 Elle peut se présenter sous toutes les formes galéniques normalement utilisées pour une application topique, notamment sous forme d'une solution aqueuse, hydroalcoolique, d'une émulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile ou multiple, d'un gel aqueux, ou d'un produit anhydre liquide, pâteux ou solide.

30 Cette composition peut être plus ou moins fluide et avoir l'aspect d'une crème blanche ou colorée, d'une pommade, d'un lait, d'une lotion, d'un sérum, d'une pâte, d'une mousse. Elle peut éventuellement être appliquée sur la peau sous forme d'aérosol. Elle peut également se présenter sous forme solide, et par exemple sous forme de stick. Elle peut être utilisée comme produit de soin et/ou comme produit de maquillage.

35 De façon connue, la composition selon l'invention peut contenir également les adjuvants habituels dans les domaines cosmétique et dermatologique, tels que des gélifiants

**REVENDEICATIONS**

1. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques dans une composition cosmétique pour application topique sur la peau,  
5 comme agent dépigmentant et/ou blanchissant de la peau.
2. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques dans une composition cosmétique pour application topique sur la peau,  
10 pour améliorer l'homogénéité de la couleur de la peau.
3. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques pour la fabrication d'une composition pour application topique sur la peau,  
destinée à la dépigmentation et/ou au blanchiment de la peau.
- 15 4. Utilisation de la DHEA ou de l'un au moins de ses précurseurs ou dérivés métaboliques pour la fabrication d'une composition pour application topique sur la peau,  
destinée au traitement des taches pigmentaires, en particulier des lentigo actiniques.
- 20 5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit précurseur est choisi parmi : le cholestérol, la prégnénolone, la 17 $\alpha$ -hydroxy prégnénolone, le 5-androstènediol, le sulfate de DHEA, le sulfate de 17 $\alpha$ -hydroxy prégnénolone et le sulfate de 5-androstènediol.
- 25 6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit dérivé métabolique est choisi parmi : le 5-androstène-3 $\beta$ -17 $\beta$ -diol (ou adiol), le sulfate de 5-androstène-3 $\beta$ -17 $\beta$ -diol et la 4-androstène-3,17-dione.
- 30 7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la DHEA ou son précurseur ou dérivé métabolique est présent en une quantité allant de 10<sup>-6</sup> à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition.
8. Utilisation selon la revendication 7, caractérisée en ce que la DHEA ou son précurseur ou dérivé métabolique est présent en une quantité allant de 0,1 à 5% en poids, par rapport au poids total de la composition.

et leurs mélanges.

12. Utilisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit autre agent dépigmentant est choisi parmi : l'acide kojique ; l'acide ellagique ; l'arbutine et ses dérivés ; l'hydroquinone ; les dérivés d'aminophénol tels que le N-cholestéryloxy-carbonyl-para-aminophénol et le N-éthoxyloxy-carbonyl-para-aminophénol ; les dérivés d'iminophénol ; l'acide L-2-oxothiazolidine-4-carboxylique ou procystéine, ainsi que ses sels et esters ; l'acide ascorbique et ses dérivés, notamment le glucoside d'ascorbyle ; et les extraits de plantes, en particulier de réglisse, de mûrier et de scutellaire.
13. Utilisation selon la revendication 10, caractérisée en ce que ledit agent kératolytique est choisi parmi : les  $\alpha$ -hydroxyacides tels que les acides citrique, lactique, glycolique, mandélique, malique et tartrique ; les  $\beta$ -hydroxyacides et notamment l'acide salicylique et ses dérivés ; les  $\alpha$ -cétoacides et les  $\beta$ -cétoacides ; les rétinoïdes et en particulier le rétinol et les esters de rétinyle ; les inhibiteurs d'HMG-CoA réductase ; et les dérivés de sucre tels que le O-octanoyl-6'- $\beta$ -D-maltose.